

### Cura della ferita

- Metta del ghiaccio esternamente sulla guancia per 2-3 ore, alternato ogni 15 minuti
- Igiene orale: spazzoli normalmente nelle zone della bocca non comprese dall'intervento, nella zona dell'intervento esegua risciacqui con un collutorio contenente clorexidina tre volte al giorno, senza diluirlo, iniziando non prima di 6-8 ore dopo l'intervento
- Dieta: non mastichi nella zona della ferita, non mangi alimenti caldi nel primo giorno. Scelga per una settimana cibi che siano facilmente masticabili e morbidi
- Riposo: quando va a letto tenga la testa sollevata da due cuscini e non appoggi sul guanciale la parte operata
- Protesi mobili: utilizzate la protesi mobile attenendosi scrupolosamente alle indicazioni che i sanitari dello studio vi hanno dato
- Suture: saranno rimosse in studio dopo 7-10 giorni
- Fumo, alcool: non fumate e non assumete alcolici nelle prime ore (=12) dopo l'intervento
- Dopo gli interventi d'implantologia non fumate

### Sanguinamento

E' normale nelle prime ore avere la saliva screziata di sangue.

Se dovesse, invece, essere presente un lieve sanguinamento applichi delle garze sterili bagnate con acqua (oppure un fazzoletto di cotone pulito e bagnato con acqua) sulla ferita e le tenga premute per almeno 20 minuti di seguito. Le garze possono essere imbevute anche con un farmaco coagulante (es. Ugurol 5 ml. Fiale). Se il sanguinamento dovesse persistere contatti lo studio.

### Dolore e gonfiore

E' normale che esaurita l'efficacia dell'anestesia si presenti una dolenzia od un dolore più marcato. Assuma il farmaco analgesico che è stato prescritto (non l'aspirina, perché favorisce il sanguinamento). Il gonfiore aumenterà nei primi quattro giorni, per poi diminuire nei giorni seguenti. Utilizzi, se il gonfiore dovesse essere importante, impacchi di ghiaccio esternamente sulla guancia. In alcuni casi può essere presente un modesto rialzo febbrile, afte e manifestazioni herpetiche.

### Farmaci

Si attenga scrupolosamente alla posologia dei farmaci che il medico le ha prescritto. Non aumenti la posologia, né interrompa l'assunzione dei farmaci senza aver contattato lo studio.

**PER QUALSIASI DUBBIO O PROBLEMA CONTATTI LO STUDIO**